



BLACKJAK®



Leonardita de alta eficacia, ácidos húmicos. Contiene humina, ácido úlmicos y nutrientes.

Capacidad 1 l 5 l 20 l

Formulación	(SC) - Suspensión concentrada
Nº Registro	Abono

CARACTERÍSTICAS

Innovadora leonardita líquida 100% natural con materia orgánica altamente descompuesta y de rápida asimilación con la importante característica de ser un medio ácido.

Contribuye a mejorar la estructura del suelo, reducir la salinidad, desbloquear la absorción de nutrientes, favorecer la actividad microbiana y aumentar la capacidad de intercambio catiónico de macro y micro nutrientes. También actúa como agente quelatante natural. Conjugua una alta eficacia debido a sus bajas dosis junto con una gran comodidad debido a su fácil y rápida solubilidad al tratarse de un líquido fácilmente soluble en agua.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Las dosis están indicadas para aplicación en fertirrigación para arándano, cítricos, fresa y fresón, frutales, hortícolas, olivo, platanera, uva de mesa y vid. Para el resto de los cultivos están indicadas en aplicación foliar. Para el resto de las aplicaciones, consúltese la etiqueta. Los modos de aplicación del producto varían en función de los cultivos y de los métodos de riego, para más información, consúltese la etiqueta o nuestro servicio técnico.

Debido a su pH y composición, puede mezclarse con la mayoría de los abonos y fitosanitarios. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.

En aplicación foliar, llenar el tanque de aplicación por la mitad. Añadir primero el producto a la dosis recomendada y posteriormente los fertilizantes foliares y/o fitosanitarios. Agitar y aplicar.

Para tratamiento de semillas, 24 horas antes de la siembra, sumergir/empapar las semillas en una solución de Blackjak® a la dosis recomendada para promover una emergencia más rápida.

Combinado con correctores, potencia una mayor y más rápida absorción de los macro y micro nutrientes.

ÉPOCA DE EMPLEO

- En hortícolas: aplicar periódicamente durante todo el ciclo.
- En fresa, fresón, frambuesa y arándano: 6 aplicaciones periódicas distanciadas 2 semanas a lo largo del ciclo del cultivo.
- En cítricos, frutales, uva de mesa, vid, olivo y platanera: durante el ciclo del cultivo.
- En el resto de los cultivos: después de la preparación del suelo y/o posterior a siembra.

CONTENIDO DECLARADO

- Extracto húmico* total 25,0% p/p
- Ácidos húmicos 20,5% p/p
- Ácidos fúlvicos 4,5% p/p
- pH 100% = 4,2

* extractos húmicos procedentes de Leonardita 100%

La leonardita (sedimento orgánico sin tratar rico en ácidos húmicos) componente del producto Blackjak® se obtiene únicamente como subproducto de actividades mineras y cumple, por tanto, con el Reglamento 889/2008 relativo a la producción ecológica.

Cultivos	Días	Beneficios	Dosis
Algodonero	n.p.	Ver características	1-2 l/ha
Apio			
Arándano			2-3 l/ha**
Cebolla			
Cerales			1-2 l/ha
Citricos			2-4 l/ha**
Frambueso			2-3 l/ha
Fresales			
Fresón			2-3 l/ha**
Frutales			2-4 l/ha
Girasol			1-2 l/ha
Hortícolas			5-10 l/ha**
Maíz y maíz dulce			1-2 l/ha
Olivo			2-4 l/ha**
Patata			1-2 l/ha
Platanera			2-4 l/ha**
Puerro			1-2 l/ha
Remolacha			2 l/ha
Tabaco			1-2 l/ha
Uva de mesa			
Vid	2-4 l/ha**		
Zanahoria	1-2 l/ha		